Nachname:

Vorname:

Matrikelnummer:

**Klausur zu
Höhere Mathematik I
Maschinenbau
SoSe 2021**

Gesamtzahl der Aufgaben: 6, Gesamtpunktzahl: 70, Bearbeitungszeit: 120 Minuten

1. (11.5 Punkte)

- a) Ergänzen Sie im Folgenden die Symbole $=$, $\implies$ oder $\iff$. Verwenden Sie falls möglich $\iff$ statt $\implies$.

Im Folgenden sei $x \in \mathbb{R}$.

i) $x < 0$ $-x > 0$

ii) x $-3 \implies x^2$ 9

iii) $2 + 2$ $\sqrt{16}$

iv) $x^3 = -8$ x -2

- b) Entscheiden Sie jeweils rechnerisch, ob der Punkt $P = (1, 1, 1)$ in der Ebene

$$E: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

oder auf der Geraden

$$g: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

liegt.

- c) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Wahr Falsch Die Menge $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 1\}$ ist ein abgeschlossenes Intervall.

Wahr Falsch Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

Wahr Falsch Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^3$ ist das Spatprodukt $[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}]$ ein Vektor im $\mathbb{R}^3$.

2. (12.5 Punkte)

- a) Untersuchen Sie, ob die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \sqrt[n]{3} \frac{(n+2)!}{n^2 n!}$$

konvergiert. Falls ein Grenzwert existiert, geben Sie diesen an. Falls kein Grenzwert existiert, geben Sie an, ob die Folge bestimmt gegen $+\infty$ oder $-\infty$ divergiert oder ob sie unbestimmt divergent ist.

- b) Gegeben ist die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \frac{n}{3^n}.$$

- i) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ streng monoton fallend ist.
ii) Entscheiden Sie, ob Infimum und Minimum von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existieren, und geben Sie diese gegebenenfalls an.

- c) Untersuchen Sie, ob die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2^k}{3^k} - \frac{2^{k+1}}{3^{k+1}} \right)$$

konvergiert, und bestimmen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert.

- d) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

- Wahr Falsch Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = (-1)^n$ konvergiert gegen -1 und $+1$.
 Wahr Falsch Jede konvergente Folge ist streng monoton.
 Wahr Falsch Eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert genau dann, wenn die Folge der Partialsummen $(\sum_{k=1}^n a_k)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert.

3. (16 Punkte)

- a) Gegeben ist die Funktion $f: D \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{e^{\tan(x)}}{(1 + \ln(x)^2)^{\frac{1}{3}}}.$$

Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}$ von f .

- b) Bestimmen Sie zu der gebrochenrationalen Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{x^2}{1 + x^4},$$

die Asymptote g .

- c) Gegeben ist die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + x^4)$.
i) Begründen Sie, ob f gerade ist oder nicht.
ii) Bestimmen Sie die größtmöglichen Intervalle, auf denen f monoton fallend oder monoton wachsend ist.
iii) Bestimmen Sie die Nullstellen von f .
iv) Ist f injektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.
v) Bestimmen Sie den Wertebereich $f(\mathbb{R})$ rechnerisch. Begründen Sie, ob f surjektiv ist oder nicht.

d) Zeigen Sie

$$(\sin(x) - \cos(x))^2 = 1 - \sin(2x).$$

e) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Wahr Falsch Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $\sqrt{x^2} = x$.

Wahr Falsch Es gilt $\frac{d}{dx}e^x = xe^{x-1}$.

4. (8.5 Punkte)

a) Gegeben ist die Funktion $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x(e^x + e^{-x})}.$$

i) Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, ohne die Regeln von l'Hospital zu verwenden.

ii) Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

iii) Ist die Funktion

$$\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{e^x - e^{-x}}{x(e^x + e^{-x})}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

stetig?

b) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Wahr Falsch Jedes $x \in [a, b]$ ist ein Häufungspunkt von (a, b) .

Wahr Falsch Für stetige Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ für alle $x_0 \in \mathbb{R}$.

Wahr Falsch Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x^2 + e^x)$ ist nicht stetig.

5. (12 Punkte)

a) Gegeben ist die Funktion $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\cos(x) + 1}$.

i) Berechnen Sie das Taylor-Polynom 2-ten Grades von f an der Entwicklungsstelle $x_0 = 0$.

ii) Berechnen und klassifizieren Sie die globalen Extremalstellen von f auf $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

b) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Wahr Falsch Ist $x_0 \in [a, b]$ eine globale Maximalstelle der differenzierbaren Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, dann gilt stets $f'(x_0) = 0$.

Wahr Falsch Jede stetige Funktion ist auch differenzierbar.

6. (9.5 Punkte)

a) Berechnen Sie das unbestimmte Integral

$$\int x^2 \cos(x) dx$$

mithilfe partieller Integration.

b) Schreiben Sie den Ausdruck

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} (2x+1)^{2n}$$

ohne Summenzeichen, indem Sie die Reihendarstellung

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

des Cosinus verwenden.

c) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Wahr Falsch Für eine stetige Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gilt

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).$$

Wahr Falsch Eine Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ konvergiert für alle $x \in \mathbb{R}$, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ ist.

Wahr Falsch Die Exponentialreihe ist keine Taylor-Reihe.