

Nachname:

Vorname:

Matrikelnummer:

Klausur zu
Höhere Mathematik I
BNUW
WiSe 2023/24

Gesamtzahl der Aufgaben: 6, Gesamtpunktzahl: 60, Bearbeitungszeit: 120 Minuten

1. (10.5 Punkte)

a) Schreiben Sie die Mengen

$$M_1 = (1, 10) \setminus (2, 3]$$

und

$$M_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid 4 \leq |x| < 5\}$$

jeweils als Vereinigung zweier Intervalle.

b) Gegeben sind $\mathbf{u} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie

i) $\|\mathbf{u}\|$

ii) $\mathbf{u} \times (-2\mathbf{v})$

iii) $\langle 3\mathbf{u}, -\frac{1}{3}\mathbf{v} \rangle$

c) Bestimmen Sie den Abstand des Punktes $P_1 = (1, 0, 1)$ zur Ebene

$$E: 2x - y - 2z + 1 = 0.$$

d) Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $\sqrt{|x|^2} = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $(x - 1)^5 = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1$.

☐ Wahr ☐ Falsch Die folgenden Geraden g_1 und g_2 sind parallel:

$$g_1: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R},$$

$$g_2: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. (11.5 Punkte)

a) Berechnen Sie jeweils den Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

$$\text{i) } a_n = \frac{1 + 2n^2}{5 - n^2} \qquad \text{ii) } a_n = \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$$

b) Gegeben ist die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$b_n = n! - 10$$

i) Berechnen Sie die ersten 3 Folgenglieder b_1, b_2, b_3 .

ii) Zeigen Sie, dass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ streng monoton wachsend ist.

iii) Entscheiden Sie, ob Infimum, Supremum, Minimum und Maximum der Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existieren und geben Sie diese gegebenenfalls an.

c) Berechnen Sie den Grenzwert der Reihe

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{5^{k-1}}{3^{2k-6}}.$$

d) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Beschränkte Folgen sind stets konvergent.

☐ Wahr ☐ Falsch Eine Reihe ist genau dann konvergent, wenn die Folge ihrer Partialsummen konvergiert.

3. (12 Punkte)

a) Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich D der Funktion

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{2 \ln(x\sqrt{x-1})}{2 - \cos(x)}.$$

b) Berechnen Sie alle reellen Nullstellen der Polynomfunktion

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = 2x^3 - 2x^2 - x + 1.$$

c) Gegeben ist die Funktion

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 1, \\ \frac{1-x}{1+x}, & x > 1. \end{cases}$$

i) Entscheiden Sie, ob g in $x = 1$ stetig ist.

ii) Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

d) Berechnen Sie die Umkehrfunktion von

$$f: [0, \infty) \rightarrow [1, \infty), \quad f(x) = 1 + \sqrt{2x}.$$

- e) Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Es gilt $\tan(\arctan(x)) = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

☐ Wahr ☐ Falsch Die Funktion $f: \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x+2)^{-3}$ ist unstetig an der Stelle $x = -2$.

☐ Wahr ☐ Falsch Hat eine gebrochenrationale Funktion mit maximalem Definitionsbereich eine Definitionslücke, so ist diese entweder eine Polstelle oder eine hebbare Definitionslücke.

4. (11 Punkte)

- a) Berechnen Sie die Ableitung von

$$f(x) = e^{x \cos(\pi x)}.$$

- b) Gegeben ist die Funktion $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \ln(x) - x.$$

Bestimmen Sie alle lokalen Extremalstellen der Funktion g und entscheiden Sie, ob es sich um lokale Minimal- oder Maximalstellen handelt. Berechnen Sie die entsprechenden lokalen Minima bzw. Maxima.

- c) Untersuchen Sie die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 3x^2$$

auf Monotonie. Geben Sie dabei möglichst große Teilintervalle von $\mathbb{R}$ an, auf denen die Funktion jeweils streng monoton wachsend beziehungsweise streng monoton fallend ist.

- d) Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x}$$

- e) Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Die Wurzelfunktion $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$ ist an der Stelle $x = 0$ differenzierbar.

☐ Wahr ☐ Falsch Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar und $f''(x_0) = 0$ für $x_0 \in \mathbb{R}$, dann ist x_0 eine Wendestelle.

5. (8 Punkte)

a) Berechnen Sie das Integral

$$\int_1^2 (2x + 1) \ln(x) dx$$

mit partieller Integration.

b) Berechnen Sie das Integral

$$\int \frac{2x + 1}{(x - 1)(x + 2)} dx$$

mit Hilfe einer Partialbruchzerlegung.

c) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Ist $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine gerade und integrierbare Funktion, so gilt

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

☐ Wahr ☐ Falsch Für jede Stammfunktion $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ einer integrierbaren Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gilt

$$f'(x) = F(x) \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$

6. (7 Punkte)

a) Berechnen Sie das Taylor-Polynom 3. Grades der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^{2x} - e^{-x}$$

zur Entwicklungsstelle $x_0 = 0$.

b) Berechnen Sie mit Hilfe der geometrischen Reihe die Taylor-Reihe der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x}{1 + 2x^2}$$

im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

c) *Bei dieser Ankreuzaufgabe ergibt jede korrekte Antwort +1 Punkt(e), jede fehlende Antwort 0 Punkte, jede falsche Antwort -1 Punkt(e). Sollte diese Punktesumme negativ ausfallen, so wird sie gleich Null gesetzt.*

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

☐ Wahr ☐ Falsch Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine in einem Intervall $(x_0 - r, x_0 + r)$, $r > 0$, beliebig oft differenzierbare Funktion, so besitzt f eine eindeutige Taylor-Reihe um den Entwicklungspunkt x_0 .

☐ Wahr ☐ Falsch Für alle $x \in \mathbb{R}_0^+$ gilt

$$\cos(\sqrt{x}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{(2k)!} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots$$