

Numerik I

Aufgabenblatt 1

Aufgabe 1

Für welche reellen Werte α und β besitzt das System

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 + x_2 & = & 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 & = & 0 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 & = & 0 \\ x_3 + \alpha x_4 & = & \beta \end{array}$$

- a) eine eindeutige Lösung (man berechne diese),
- b) mehrere Lösungen (man gebe die allgemeine Lösung an),
- c) keine Lösung.
- d) Man bestimme die Determinante der Systemmatrix \mathbf{A} .

(4 P)

Aufgabe 2

- a) Welche der im folgenden gegebenen Vektoren sind linear abhängig?

$$(i) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 28 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (ii) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -11 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -15 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (iii) \begin{pmatrix} 7 \\ -12 \\ 25 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- b) Man bestimme das $\alpha \in \mathbb{R}$, für das die folgenden Vektoren linear abhängig sind:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Für dieses α stelle man \mathbf{v}_j ($j = 1, 2, 3$) jeweils als Linearkombination der anderen Vektoren \mathbf{v}_k ($k \neq j$) dar.

(4 P)

Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2}}, \quad x \neq 2.$$

- a) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom dritten Grades zum Entwicklungspunkt $x_0 = 4$.
- b) Veranschaulichen Sie den Verlauf der Taylor-Polynme $T_0(x; x_0)$, $T_1(x; x_0)$ und $T_2(x; x_0)$.
- c) Schätzen Sie den Approximationsfehler im Intervall $[3, 5]$ mit Hilfe der Restgliedformel von Lagrange

$$R_n(x; x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \Theta(x - x_0), \quad 0 < \Theta < 1,$$

ab.

(4 P)

Abgabe: Dienstag, 28.10.2003 in der Vorlesung