

# Numerik I

## Aufgabenblatt 5

### Aufgabe 1

Gegeben sei die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{7}{8} \cos \frac{\pi}{4} & \frac{7}{8} \sin \frac{\pi}{4} \\ -\frac{7}{8} \sin \frac{\pi}{4} & 1 - \frac{7}{8} \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix}$$

und der Vektor

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, daß das lineare Iterationsverfahren

$$\mathbf{x}_{n+1} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x}_n + \mathbf{b}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

für beliebigen Starvektor  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$  gegen die eindeutig bestimmte Lösung  $\mathbf{x} = (0, 0)^T$  konvergiert, obwohl eine Matrixnorm mit

$$\|\mathbf{I} - \mathbf{A}\| > 1$$

existiert. Veranschaulichen Sie beide Sachverhalte zudem graphisch. (4 P)

### Aufgabe 2

Geben Sie ein Beispiel an, bei dem die linearen Iterationsverfahren

$$\psi(\mathbf{x}, \mathbf{b}) = \mathbf{M}_\psi \mathbf{x} + \mathbf{N}_\psi \mathbf{b}$$

und

$$\phi(\mathbf{x}, \mathbf{b}) = \mathbf{M}_\phi \mathbf{x} + \mathbf{N}_\phi \mathbf{b}$$

nicht konvergieren und die Produktiteration

$$(\psi \circ \phi)(\mathbf{x}, \mathbf{b}) = \psi(\phi(\mathbf{x}, \mathbf{b}), \mathbf{b})$$

konvergiert. (4 P)

### Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktion  $f$  mit

$$f(x) = 3(x - \ln x) - \frac{13}{4}.$$

- Man zeige, dass  $f$  genau zwei Nullstellen besitzt.
- Man berechne die beiden Nullstellen von  $f$  mit Hilfe des Fixpunktverfahrens, wobei die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes jeweils zu überprüfen sind.
- Für die berechnete Näherung  $x_{10}$  führe man jeweils eine a priori und eine a posteriori Fehlerabschätzung durch.

(4 P)

### Aufgabe 4

**Programmieraufgabe:** Abgabe Dienstag, 2.12.2003 in der Vorlesung

Programmieren Sie das Jacobi- und Gauß-Seidel-Verfahren. Berechnen Sie mit beiden Verfahren die Näherungslösungen zu den Beispielen

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 2 \\ 5 & 4 & 10 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \text{b)} \quad & \begin{pmatrix} a & 14 \\ 7 & 50 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}^+ \setminus \left\{ \frac{49}{25} \right\}. \end{aligned}$$

Verwenden Sie jeweils den Startvektor  $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$  und  $a = \frac{1}{2}, 1, 2, 10, 100$ . Abzugeben sind:

- Das gut kommentierte Programm.
- Im konvergenten Fall jeweils  $\mathbf{x}_n$  und  $\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_{n-1}\|_\infty$  für  $n = 1, 2, 3, 5, 10, 15, \dots, 30$ .
- Im divergenten Fall eine mathematisch fundierte Begründung für die Divergenz.

(8 P)

**Abgabe:** Dienstag, 25.11.2003 in der Vorlesung